

注射用紫杉醇说明书

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/ea64273af76323f545f2a073a30171bc.html>

范文网，为你加油喝彩！

注射用紫杉醇(白蛋白结合型)适用于联合化疗治疗失败或辅助化疗6个月内复发的转移性乳腺癌。如无显著禁忌症，病人在使用本品前应接受过蒽环类药物治疗。下面是学习啦小编整理的注射用紫杉醇说明书，欢迎阅读。

注射用紫杉醇商品介绍

通用名：注射用紫杉醇(白蛋白结合型)

生产厂家: 美国American Pharmaceutical Part

批准文号：

药品规格：100mg*1瓶

药品价格：¥ 6100元

注射用紫杉醇说明书

【商用名】注射用紫杉醇

【通用名】注射用紫杉醇(白蛋白结合型)

【英文名】paclitaxel For Injection(Albumin Bound)

【汉语拼音】ZhuSheYongZiShanChun

【主要成分】紫杉醇

【性状】

【适应症】注射用紫杉醇(白蛋白结合型)适用于联合化疗治疗失败或辅助化疗6个月内复发的转移性乳腺癌。如无显著禁忌症，病人在使用注射用紫杉醇(白蛋白结合型)前应接受过蒽环类药物治疗。卵巢癌和乳腺癌及NSCLC的一线 and 二线治疗。头颈癌、食管癌，精原细胞瘤，复发非何

金氏淋巴瘤等。

【用法用量】 转移性乳腺癌联合化疗失败或辅助化疗6个月内复发的患者，推荐注射用紫杉醇(白蛋白结合型)剂量为每3周一次260mg/m²，静脉滴注30分钟以上。

肝脏损害：对于胆红素>1.5mg/ml的病人，注射用紫杉醇(白蛋白结合型)的剂量未定。

药物减量：使用注射用紫杉醇(白蛋白结合型)过程中，出现严重中性粒细胞缺乏(中性粒细胞计数