

# 学生疟疾怎么办

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678209949178812.html>

范文网，为你加油喝彩！

疟疾这种疾病的出现，会给大家的健康带来很大的威胁，只要大家可以认真的治疗这种疾病，  
疟疾才

能慢慢的恢复

健康，大家平时一定要注意

保暖，尽量避免患上疟疾这种疾病。下面<https://www.882682.com/>为大家介绍学生疟疾怎么办？

## 1、控制临床发作的药物：

蒿甲醚：适用于各型疟疾，主要用于抗氯喹恶性疟的治疗和凶险型恶性疟的急救。退热及原虫转阴速度均较氯喹为快，主要作用于疟原虫的红内期。肌肉注射后吸收完全，血药达峰时间为7小时，半衰期为13小时。本药在体内分布甚广，可透过血脑屏障，以脑组织分布最多，肝、肾次之。经胆杜甫的诗被称为汁和尿液排泄。本药不良反应轻微，头号玩家豆瓣个别患者有转氨酶轻度升高。妊娠妇女慎用。

成人用量：肌内注射，首次160mg，后每12小时1次，每次80mg，连用5次。如果血液中仍能够检查到疟原虫可改为每日80mg肌肉注射，2~3天，至血液中疟原虫检查为阴性。

儿童用量：肌内注射，首次按体重3.2mg/kg;第2-5日每次1.6mg/kg，每日1次。

## 2、防止复发：

伯氨喹啉：本品可杀灭各种疟原虫的组织期虫株，尤以间日疟为著，也可杀灭各种疟原虫的配子体，对恶性疟的作用尤强，使之不能在蚊体内发育，对红内期虫株的作用很弱。不良反应有头昏、恶心、腹痛等，少数病人可有药物热、粒细胞缺乏等，停药后即可恢复。葡萄糖湖北省警官学院-6-磷酸脱氢酶缺乏者服用本药可发生急性溶血性贫血，一旦发生应停药作对症治疗。

用法与用量：成人每次13.2mg，每日3次，连服7天。

上面介绍的就是疟疾这种疾病的治疗方法。对于疟疾这种疾病的治疗，大家应该很清楚了，平

时大家要注意自己的健康，如果发现疟疾的症状的话，千万不要一直生活在潮湿的环境中，认真的护理患者，尽量远离疟疾带来的伤害  
，想要了解更多的校园传染病知识洗衣机买什么牌子好  
请到<https://www.88>  
大学英语六级多少分过[2682.com/](http://2682.com/)，这里我们会为大家讲到校园常见传染病有哪些。

更多 作文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发