

这是支气管扩张的症状吗？

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678616939228544.html>

范文网，为你加油喝彩！

不太像，建议去拍个胸片看一下。

支气管扩张的诊断要依据以下方面：

一病史症状：

幼年可有麻疹百日咳支气管肺炎肺结核等病史；症状为慢性咳嗽咳痰痰量和痰的性质不等；部分有咯血咯血量和诱因各异；多数有间歇性发热乏力纳差心慌气急等症状

二 体检发现：

副鼻窦及口咽部可有慢性感染病灶；早期及轻症者无异常体征感染后肺部可闻及干湿性罗音和哮鸣音晚期可有肺气肿肺动脉高压杵状指（趾）等体征

三辅助检查：

（一）X线胸片：轻症多无异常发现重症病变区肺纹理增多增粗排列紊乱有时可见支气管呈柱状增粗或“轨道征”典型呈蜂窝状或卷发状阴影其间夹有液平面的囊区

（二）支气管碘油造影：可发现囊状柱状或囊柱状改变吧主申请变目前仅在外科手术前采用

（三）胸部薄层CT扫描：对支气管扩张的诊断具有一定的价值

（四）痰细菌学培养：对抗生素的合理应用具有指导意义

支气管扩张的症状是什么，得了支性诱惑图气管扩张怎么嗓子哑了

支气管尾怎么做好吃管扩张的症状：

1：反复咯血50%~70%的患者有程度不等的咯血，从痰中带血至大量咯血，咯血量与病情严重程度、病变范围有时不一致。部分患者以反复咯血为唯一症状，临床上称为“干性支气管扩张”，其病变多位于引流良好的上叶支气管。

2：反复肺部感染其特点是同一肺段反复发生肺炎并迁延不愈。这是由于扩张的支气管清除分泌物的功能丧失，引流差，易于反复发生感染。

3：慢性感染中毒症状如反复感染，可出现发热、乏力、食欲减退、消瘦、贫血等，儿童可影响发育。

4：慢性咳嗽、大量脓痰与体位改变有关，这是由于支气管扩张部位分泌物积储，改变体位时分泌物刺激支气管黏膜引起咳嗽和排痰。其严重程度可用痰量估计：轻度，<10ml/d；中度，10~150ml/d；重度，>150ml/d。急性感染发作时，黄绿色脓痰量每日可达数百毫升。感染时痰液收集于玻璃

瓶中静置后出现分层的特征：上层为泡沫，下悬脓性成分，中层为混浊黏液，下层为坏死组织沉淀物。引起感染的常见病原体为铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和卡行业报告他莫拉菌。

以上是对支气管扩张症状的介绍，如果有这方面的疾病，可以考虑到南京解放军454医院治疗。

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发