

最容易被忽视的肺癌信号有哪些？

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678649391233033.html>

范文网，为你加油喝彩！

1、咳嗽

- (1)它是肺癌患者最早和最常见的症状，由于起病时常类似感冒或支气管炎，故易被忽视。
- (2)因此，凡以往无慢性呼吸道疾患的人，尤其是40岁以上者，经过积极治疗，咳嗽持续三周以上，须进一步检查。
- (3)至于老年慢性支气管炎病人，肺癌的发病率较一般人为高，但其早期的咳嗽症状常易与原有的慢性咳嗽相混淆，因此而延误诊断的情况甚多推荐乳液。
- (4)这时必须要注意咳嗽性质和咳嗽规报酬英文律的改变。肺癌患者由于癌组织对支气管粘膜的刺激，咳嗽常为刺激性呛咳和剧咳、痰少，与原有的四季发病规律不符，经积极抗感染治疗无效，症状反见加重。

2、咯血

- (1)肺癌的第二个常见症状，常因癌组织侵犯支气管粘膜而引起。
- (2)咯血量一般很少，常为血丝痰，可持续数周、数月或呈间歇性发作。
- (3)由于咯血的量少或间歇出现，易被人疏忽。事实上，中年以上出现血痰者，约有1/4为肺癌所致。因此，当出现不明原因的痰血时冬季养生知识，切莫麻痹大意。

3、持续胸痛

- (1)胸痛者者约占肺癌病人的半数以上，特别是周围型肺癌，胸痛可为首发症状。
- (2)由于癌组织浸润胸膜所致。胸痛常固定于病变部位，早期多呈间歇性隐适考是什么意思痛不适。
- (3)体位改变、深呼吸和咳嗽时可使之加剧。因此，凡不明原因而出现固定部位的胸痛，应早做相应检查。

温馨提示：咳嗽、咯血、持续胸痛是肺癌的重要信号，如果出现以上的情短长况一定要及时的检查，尤其对于长期吸烟的患者更要做好日常的预防。

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发