

桂花介壳虫用什么药管用 治疗措施与防治方法

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678836028260707.html>

范文网，为你加油喝彩！

桂花介壳虫症状

桂花介壳虫症状表现为被侵染的叶片上产生近圆形或不规则形病斑，直径2-5毫米。病斑初期褐色，后期中央变灰色，边缘红褐色。病斑两面散生细小的灰褐色霉点，常常互相联合，造成叶面枯死。

桂花长介壳虫危害

桂花常见的病害大都发生在叶部，主要有桂花褐斑病、桂花枯斑病、桂花炭疽病，这些病害可引起桂花早落叶，削弱植株生长势，降低桂花产花量和观赏价值。

引起的桂花介壳虫原因

对于桂花介壳虫，小情歌英文版高温高湿常常是发病诱因，经风雨传播，进行侵染，10月以后病情会有所减退。

桂花介壳虫用什么药效果好

桂花介壳虫能治好。用噻嗪酮、噻虫嗪、苯氧威、啶虫脒、毒死蜱、藜芦碱或苦参碱等试剂进行叶面喷洒，只要喷洒到介壳虫上，就能将介壳虫杀死。

桂花介壳虫防治方法

介壳虫处理方法

介壳虫处理方法是在若虫孵化期喷布20%菊杀乳油或2.5%溴氰菊酯乳油2500倍液防治；在介壳形成时，喷洒40%速扑杀乳带有拼音的三经油1500倍液，因渗透性强，防治效果好。

介壳虫预防措施

1、人工刷除：桂形容心情的词语花树介壳虫的虫体被一层角质的甲壳包裹着，直接喷药不易奏效，防治介壳虫要选择适宜时期和恰当方法。当少量发生时，可用软毛刷轻轻地刷除，收效良好。

- 2、冬季防治：冬季剪除有虫枝条和清扫落叶，并集中销毁，或刮除枝条上的越冬虫体，或喷洒5-10%的轻柴油乳剂、波美3-5度石硫合剂。
- 3、夏季防治：夏季若虫孵化初期未分泌蜡质或蜡被初形成时喷药防治。可选用0.3至0.5波美度石硫合剂喷有利，或者1青年学0%吡虫啉1500倍液，单用或混用，每隔7至10天喷1次，连喷2至3次。
- 4、树干涂药：于4月在树干基部轻刮皮成上下错开的两个半圆，那一刻我长大了作文450字环宽略等于干茎的一半，涂以吡虫啉、杀虫双、乐果等内吸性药剂400-500倍，然后用聚乙烯薄膜包扎紧密，15-20天后解除。
- 5、树干注药：在树干上按120度圆周角从三个方向注射，每厘米干茎用内吸类药0.2克（有效成分），注后用泥封口。

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发