

莲藕病毒病症状与防治方法

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678838319261237.html>

范文网，为你加油喝彩！

莲藕病毒病症状

莲藕病毒病的株短于健株，叶片非常薄，有些病叶有浓密绿色斑驳和萎缩，有呼伦贝尔市卫生局些病叶局部变黄，有时病叶的包皮不容易展开，在病田中常见植物叶柄上蚜虫群破坏。

莲藕病毒病危害

莲藕病毒病危害：

病毒株较健株的叶片细小，而且病叶对照日光下可见浓绿相间，有的叶片局部褪绿，有的病叶抱卷不展开，有的皱缩粗糙，有的叶脉明显突起，叶呈畸形，在病田中常见蚜虫群集于叶背、叶柄处危害。

莲藕病毒病原因

莲藕病毒病易发病原因是种子带毒、蚜虫的危害以及高温干旱天气情况下容易生病。

莲藕病毒病用什么药

在莲藕浪费资源病毒病发现后，每隔10天左右喷2-3次药剂治疗，可使用20%的杜克星可湿性粉剂兑500斤水溶液、5%的君都清可湿性粉剂兑500斤水溶液等。

治疗莲藕病毒病特效药

治疗莲藕病特效药：

田间喷施叶面营养剂加0.1%的洗衣皂，发病初期可使用5%的菌毒清水剂兑500斤水溶液等喷雾防治，每隔10天左右给植株喷一次，连喷2-3次即可。

莲藕病毒病防治方法

莲藕病毒病的防治什么的乐趣要采取因地制宜选育抗病高产河虾的家常做法品种，并在蚜虫迁徙高峰期，加强检查，及时杀灭蚜虫和预防疾病，同纪灵时挖掘受感染植物，防止感染传播。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发