

海蟹品种

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/91781b69378568c7bd5652001c204d5e.html>

范文网，为你加油喝彩！

夫妻之间如何沟通-进伙



2023年3月20日发(作者：女人发情)

我国淡水鱼种类及分布情况

我国是世界上淡水水面较多国家之一，淡水面积约为三亿亩，其中可供养鱼的水面约7500

万亩。由于我国大部分地区位于温带或亚热带，气候温和、雨量充沛，适于鱼类生长，又有

草、鲢、鳙、青、鲮、鲤、鲫、团头鲂等优良鱼类的养殖技术，所以是当今世界淡水养殖业

最为发达的国家，无论养殖的面积和总产量都居世界领先地位。由于我国地域广阔，地理和自然环境各异，各地区的鱼类品种各具特色。按照气候的区域分类，以下是鱼类的分布情形：

东南区：其中包括广东、广西、云南、贵州、福建、台湾和海南岛等地，这些地区主要生长喜暖性鱼类，品种繁多。其中代表鱼类有鲢鱼、卷口鱼、中华鲢鱼、东坡鱼、花鳊鱼、腊光长鳊、沙鳊、扁头平鳊、爬岩鳊、平鳍鳊、小吻鱼、长鳍鳊、胡子鳊、鳊、黄鳊、斗鱼、攀鲈等，而主要养殖鱼类为青、草、鲢、鳙、鲮、团头鲂、胡子鳊、罗非鱼等南方品种。

江河平原区：其中包括长江中下游、黄河下游及辽河下游，这里除了江河葡萄皮的功效与作用流域，还有众

多的湖泊，是我国淡水鱼类的主产区。天然水产鱼类众多而盛名，有青、草、鲢、鳙、鲤、

鲫、鳊、鳊、鳊、团头鲂、乌鳊、鳊等，太湖的银鱼、长江的的鲟鱼、鲟鱼、鲟鱼产量很

大，养殖的鱼种有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、团头鲂、罗非厦门鼓浪屿一日游鱼以及一些鲤鱼的杂交品种。

北部区：这里主产冷水鱼类，天然水体盛产鲟鱼属、狗鱼属、哲罗鲑属等鱼类，如大马

哈鱼、狗鱼、香鱼、雪鱼、拟赤梢鱼、八目鳊等是这里的特有而具代表性的鱼类。人工养殖

除青、草、鲢、鳙、鲤、鲫和团头鲂，还饲养红鳊鱼。

西北高原区：包括新疆、西藏北部、内蒙、青海、甘肃、陕西、山西等地，这些是典型

的大陆性气候。天然水体盛产中华弓鱼、黄瓜鱼、裸鲤等，其它还有条鳅、江鳅等鱼类。

怒澜区：其中包括西藏南部、四川、云南西部。怒江、澜沧江、金沙江、雅鲁藏布江都

流经这里，使东南区和西北高原区的鱼类，通过江流共存于此，如鲢鱼、中华鲮鱼、东坡鱼、

平鳍鳅、沙鳅、条鳅、须鳅、鲈鱼、黄缮、乌鳢、中华弓鱼等形成东南区及西北区鱼类群系

混合的特点。主要养殖仍是青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、团头鲂以及近年大量繁殖的鲤鱼杂交

品种等。

国淡水鱼主要养殖品种有哪些？各有什么特点？

目前，我国淡水养殖的水产品种有数十种。其中，普通养殖种类有传统的“四大家鱼”、鲤鱼、

鲫鱼、团头鲂等，还有近些年来新发展的（包括从国外引进的），如

尼罗罗非鱼、淡水白鲳、斑点叉尾鮰、黄

鳊、鳊鱼、河蟹等。现分别将目前市场上畅销的主要淡水养殖品种作简要的介绍。

青鱼俗称青鲩、螺蛳青。青鱼原产于长江、珠江水系，现在全国各地均有养殖，因实行轮捕

轮放，全年均有生产，以秋冬季为旺季。青鱼体青灰色，背部尤深，腹面灰白色，各鳍均为

灰黑色。青鱼个体大，肉厚、多脂、味美，刺大而少，富含营养，是淡水鱼中的上品，经济

价值很高草鱼俗称白鲩、草鳊。草鱼是我国主要淡水养殖鱼类之一，分布广，南北均产，以

11~12月份产量最多。草鱼是大型鱼，体呈茶黄色，背部青灰，腹面白色。草鱼肉质白嫩、

韧性好、出肉率高

鲢鱼

俗称白鲢、家鱼。鲢是淡水为什么喜欢一个人
水养殖的优良品种，全国各地都养殖，有的地区还实行轮捕轮放，

故全年均有生产。鲢体侧扁，头较大，体背部为灰色，腹部银白色，各鳍均为灰白色。其肉

较嫩，肉质较坚实好吃。鲢鱼腹部（胸鳍以下）富含脂肪，肉质软，味极鲜美。因其价廉，

适于日常家庭消费

鳙鱼

俗称花鲢、胖头鱼。鳙鱼是优良的淡水养殖品种，为我国主要淡水经济鱼类之一，各地都有

生产，以10~12月份产量最多。鳙鱼体侧扁、较高，头大，体背面及两侧面上部微黑，两侧

有许多不规则的黑色斑点，腹面灰白色，各鳍均为淡灰色。其肉肥嫩，营养丰富，除肉外，

其营销话术

头部富含胶质鲤鱼俗称鲤拐子。鲤鱼适应性强，可在各类水域中生活，为广布性鱼类。是

养殖的主要对象，也是淡水鱼中总产量最高的一种，全年均有生产，以春秋两季产量较高。

鲤鱼体长，略侧扁，背部在背鳍前稍隆起，其外形美观，营养丰富。鲤鱼药用价值亦高，其

性味、干、平，具有清热解毒、健胃止咳、利尿消肿、安胎通气之功效

鲫鱼俗称鲫拐子、鲫壳子。全国各地水域常年均有生产，以2~4月份和8~12月份的鲫鱼

最肥美，为我国重要食用鱼类之一。鲫鱼一般体背面灰黑色，腹面银灰色，各鳍条灰白色。

因生长水域不同，体色深浅有差异。鲫鱼肉质细嫩，肉味甜美，营养价值很高，每百克肉含

蛋白质13克、脂肪11克，并含有大量的钙、磷、铁等矿物质。鲫鱼药用价值极高，其性味

甘、平、温，入胃、肾，具

有和中补虚、除湿利水、补虚羸、温胃进食、补中生气之功效，尤其是活鲫鱼汆汤在通乳方

面有其他药物不可比拟的作用

团头鲂又称武昌鱼。原产于长江中游的湖泊，以湖北省梁子湖所产为最著名，现已被移植到

各地天然水域中，并发展了人工养殖。团头鲂外形和长春鳊、三角鲂相似。身体呈灰黑色，

体背部略带黄铜色泽，

各鳍青灰色。团头鲂生长较快，体中型大，最大可达3千克，其肉味

腴美，含

肉量多，是一种名贵的经济鱼类

翘嘴红鲌俗称大白鱼、白丝。我国平原诸水系均产，以湖北、安徽和黑龙江省产量最多。每

年6~7月份和10~11月份为捕捞旺季。翘嘴红鲌体型较大，常见为2~2.5千克，最大者重

达10~15千克。翘嘴红鲌体细长，侧扁，呈柳叶形。体背浅棕色，体侧银灰色，腹面银白

色，背鳍、尾鳍灰黑色，胸鳍、腹鳍、臀鳍灰白色。其肉洁白鲜嫩，营养价值较高，唯多细刺，鲜食和腌制均宜

细鳞斜颌鲷俗称沙姑子、黄条。分布广，从黑龙江流域到珠江流域均有古儿别速。细鳞斜颌鲷体侧扁，

背部较高，头小，吻钝。体银白色，背部灰黑色，背鳍灰色，臀鳍淡黄色，尾鳍橘黄而后缘黑色，其他各鳍灰白色。生长快、肉味鲜美，营养价值高，是重要的经济鱼类之一

胭脂鱼俗称黄排、火烧鳊。胭脂鱼体形随生长而变化，幼时体高，成年体长。体色也随生长而变化，幼鱼体侧有3肌腱炎最佳治疗方法条黑褐色横斑，稍大则体色灰褐并渲染有红紫色的彩晕；成鱼体色粉

红或略带青紫色，从吻端至尾鳍基有1条猩红色的宽条。胭脂鱼栖息于水体中、下层，主食底栖无脊椎动物和有机碎屑。3~4月在江河上游急流石滩产卵，幼鱼和未成熟个体也见于江河中下游及湖泊中。个体大，生长较快，是大型经济鱼类。同时，也是胭脂鱼科分布在亚洲大陆的唯一种，具重要的学术价值，属国家二类保护动物。分布于长江及闽江水系

泥鳅

小型鱼，体圆筒形，体背及两侧灰黄色或暗褐色，体侧下半部白色或浅黄色。头、体及各鳍均有许多不规则的黑色斑点，背鳍及尾鳍膜的斑点排列成行。除西部高原外，各地淡水水域中均产，以南方河网地带较多。一年四季均可捕到，春季较多。泥鳅肉质细嫩，营养价值很

高

黄颡鱼

俗称黄腊丁、嘎牙子。背部黑褐色，体侧黄色并有宽而长的黑色断纹，腹部淡黄色，各鳍灰黑色，鼻须一半白色一半黑色。分布广，全国各主要水系的江河、湖泊、水库、池塘等均有出产。一般常年均产，4~10月份为旺季。为常见的食用鱼类之一。其肉质细嫩，味道鲜美，小刺，多脂。蛋白质含量16.1克，脂肪0.7克，钙、磷含量居江河鱼类之冠，有益体强身、发奶之功效长吻鮠俗称江团、鮠鱼、淮王鱼。一般体长30余厘米，重1千克，最大个体可达10千克。全身无鳞，背鳍和胸鳍具硬刺，体粉红色，背部略带灰色，腹部白色，各鳍青灰色。分布于长江及辽河等水域，肉质细嫩、味鲜美、无肌间刺、营养丰富芦荟干且具药用价值。其

鳔特别肥厚，纹理呈

笔架状，干制品为名贵的笔架鱼肚，系名贵菜肴，鱼中珍品

鳊鱼俗称桂鱼。体侧扁而高，背部隆起。体黄绿色，腹

部灰白色，体侧有不规则的褐色斑点和斑块。江河、湖泊、水库均产，长江流域的湖北、江西、安徽等省产量较多，为名贵的食用鱼，在国际市场上也颇受欢迎。鱼刺少，肉丰厚细嫩洁白，以鲜肥不腻为其特点；营养丰富，每百克肉含蛋白质18.5克、脂肪3.5克。其鳍刺有

毒，被它刺伤会引起剧烈肿痛，应特别小心

尼罗罗非鱼俗称非洲鲫鱼。原产于约旦的坦噶尼喀湖，我国于1978年从泰国引进并推广养

殖。尼罗罗非鱼外形类似鲫鱼，体侧扁，背较高。体色因环境而有变化，在非繁殖期间为黄

棕色，在繁殖期间，雄鱼的纵斑带消失，体色呈灰黑色，腹部黑色，头部淡红色，背、胸、

尾鳍的边缘呈淡红色。尼罗罗非鱼是罗非鱼中最大型的品种，而且骨刺少，肉质细嫩且富于

弹性，味道鲜美，营养价值亦高，其风味可与海洋鲷鱼、比目鱼媲美

淡水白鲳学名叫短盖巨脂鲤。体侧扁，背部较厚，体呈银灰色，胸、腹、臀鳍呈红色。淡水

白鲳原产于南美洲亚马逊河，1985年引入广东等地进行人工养殖，目前已在广东、浙江、福

建等近10个省（市、区）进行商业性养殖生产。该鱼生存水温在10 ~ 42 ，最适水温为

28 ~ 30 。可单养也可同家鱼混养。放养时间为5~6月份，商品鱼起捕上市为9~10月份。

淡水白鲳是热带和亚热带食用和观赏兼备的大型热带鱼类，它除了具有罗非鱼的优点外，还

有比罗非鱼生长快，耐低氧、易捕捞等特点。该鱼肉质细嫩鲜美，属名贵淡水鱼类

黄鳝又称鳝鱼，体细长，一般体长25~40厘米，体呈黄褐色，具不规则黑色斑点，腹面灰

白色。除青藏高原外，全国各地均产，长江流域较多，4~8月为生产旺季。为我国的特产经

济鱼类。其肉细嫩，味鲜美，刺少肉厚，可食部分达65%。营养丰富，每百克肉含蛋白质18.8

克、脂肪0.9克，以及钙、磷、铁和多种人体必需氨基酸。黄鳝也有药用价值，具有补中益

气、消炎祛毒、除风湿之功效

甲鱼又称鳖或团鱼。甲鱼是以肉食为主的杂食性动物，主要食物为小鱼、小虾、螺、蚌、水

生昆虫、蚯蚓、动物内脏等，同时也兼食蔬菜、草类、瓜果等。甲鱼含有丰富的描写早春的诗句
优质蛋白质、

矿物质、微量元素以及维生素A、B1、B2等，同时，甲鱼的药用价值很高，具有滋阴、滋补、

清热等功效

乌鳢

俗称黑鱼、财鱼。全身青褐色，头、背包较深暗，腹部较淡。体侧有许多不规则的黑色斑条，

头侧有二纵行黑色条纹。全国各水系各类水域常年均有生产。乌

鳢含肉量高，肉白嫩鲜美，富有营养，每百克肉含蛋白质19.8克、

脂肪1.4克，为最佳溜鱼片原料。乌鳢出水后不易死亡，死后肌体也不易腐烂变质，便于

运输加工。其药用价值亦高，有祛湿利尿、去瘀生新、通气消肿等功效。很

受国内外市场欢迎，经济价值较高

斑点叉尾鮰

俗称沟鲶、河鲶。原产于美国密西西比河，通过驯养已成为美国主要淡水鱼类。近些年世界

许多国家都纷纷引种养殖。我国于1984年由湖北省首次从美国引进。斑点叉尾鮰是大型的淡

水鱼类，最大个体可达35千克以上，含肉率高，蛋白质和维生素含量丰富，肉质细嫩，味道鲜美，深受美国和其他许多国家消费者的欢迎，加工好的成品和半成品在西欧、日本等地均较畅销

银鲫属鲫鱼的近缘亚种。银鲫的体形及体色与普通鲫鱼极相似，但身体比普通鲫鱼显著地高且宽，体色较深，生长速度为普通鲫的2~3倍，个体也较大，最大个体可达3公斤。银鲫的生活习性与鲫相似，喜栖息于浅水、水草丛生、底质多淤泥的地方，产卵期一般在5月底至7月初，第一次性成熟的年龄多数为3龄。银鲫具有食性广、易饲养、繁殖简便、生命力强、病害少、肉味佳、营养丰富、经济价值高等优点为杂食性鱼类。银鲫广泛分布于欧、亚大陆的温带水域

河鲀俗称气泡鱼，吹肚鱼。河鲀鱼全体椭圆形，体背灰褐，体侧稍带黄褐，腹面白色；体背、侧面的斑纹随种类不同而各异。河鲀为暖温带及热带近海底层鱼类，栖息于海洋的中、下层，有少数种类进入淡水江河中。河鲀的食性杂，以鱼、虾、蟹、贝壳类为食，亦食昆虫幼虫、枝角类、桡足类以及高等植物的叶片和丝状藻类。河鲀肌肉洁白如霜，肉味腴美，鲜嫩可口，含蛋白质甚高，营养丰富。食用河鲀肉，除品尝其鲜美外，还有降低血压，治腰腿酸软，恢复精力等功能。但是河鲀毒性极大，如烹调不当，食后往往中毒，甚至危及性命。食用时必须选择鲜活鱼体，严格去除内脏，以免中毒

五、水产业

水产业是在海洋和江、河、湖、沼等水域中从事捕捞或养殖水生动物的生产事业。它包括了捕捞、养殖、保鲜加工和运销等一系列生产环节，一般以鱼类的捕捞、养殖和加工为主，故有时也习惯地称为渔业。

我国的水产业有淡水和海洋两大部分。

(一)海洋水产业

海洋水产业就是对海洋中的鱼类、虾蟹类、贝类、藻类和海兽类等水产资源进行人工繁殖、合理捕捞和加工利用的生产事业。它包括了海洋捕捞业和海洋养殖业。目前我国以海洋捕捞业为主。我国海洋水产品中，鱼类产量最大，约占四分之

三。

1.渤海海区渔场

渤海位于我国北部，南北西三面被陆地环抱，是个内海。东南以渤海海峡与黄海相连，总面积7.7万多平方千米，平均水深18米，有辽东湾、渤海湾和莱州湾三个大海湾，有辽河、滦河、海河和黄河流入，带来大量泥沙和有机物质，使沿海浮游生物丰富，天然饵料多，成为鱼类的天然产卵场所和重要渔场。有常见鱼类70多种，加上虾、

蟹、贝、藻类，共计170多种。主要水产有小黄鱼、带鱼、鳓鱼、对虾、毛虾及海蟹等。渤海水浅坡度缓，发展养殖业潜力很大，但因捕捞过于集中及污染等原因，资源日见衰退。

2. 黄海海区渔场

黄海位于长江口北角至济州岛西角一线以北，渤海以东海域，面积为渤海的5倍，平均水深44米，全部属浅海大陆架。有各种鱼类200多种，是我国唯一有冷水性鳕鱼分布的海区。主要经济鱼类有大小黄鱼、带鱼、乌贼、鳕鱼、鱿、鳓等。黄海水产资源也有衰退趋势，现已

采取措施，禁止滥捕，保护资源。

3. 东海海区渔场

东海包括广东省南澳岛至台南鹅銮鼻一线以北、黄海以南的广大海域。面积相当于黄海的2倍。地处亚热带，为热带、温带过渡地区，因而南北鱼类兼而有之，以温带性种类为主，有各类鱼种700多种，东海海区是我国最大的海洋渔业产区，主产全国四大经济鱼类即带鱼、大黄鱼、小黄鱼、墨鱼，已建有上海、舟山、宁波、镇江、温州、镇海、马尾和厦门等重要渔港。其中浙江的舟山渔场是全国最大的海洋渔业基地，商品鱼数量约占全国1/2。

4. 南海海区渔场

南海面积为东海的3倍多，南海四周较浅，中间深陷，是一个深海盆地，海域十分辽阔，是

我国海洋水产的第二大产区。鱼类种类众多，经济价值较高的有兰园参、沙丁鱼、海蛇等，还盛产金枪鱼、鲨鱼等大洋性鱼类，海龟、海参、玳瑁等是南海的特产。

(二)淡水水产业

我国水域分布很广，有各种淡水水面3亿多亩，淡水渔业历史悠久，是世界上开展池塘养鱼最早的国家。从渔业生产的自然条件、资源分布和渔业生产现状来看，可将全国分为四大水产区。

1.长江、淮河流域渔区

本区包括秦岭—淮河以南、南岭以北的长江中下游平原、盆地和丘陵地区，是全国最大的淡水渔产区。本区位于亚热带范围内，雨量充沛，河湖密布，水质肥沃，水产资源极为丰富。鱼类繁多，约260多种，主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、银鱼等，还有虾、蟹、贝、螺、龟等。

2.华南塘鱼精养区

本区包括两广和福建南部，是我国淡水渔业发达地区之一，是全国第二大渔区。这里地处热带、亚热带，鱼类生长期长，生长迅速，是全国淡水鱼单产最高的地区。

以养殖为主，养殖的品种主要有草、鲫、鲢、鲤、青等。珠江三角洲形成了农渔副结合最经

济、最合理的“桑基鱼塘

”、“蔗基鱼塘”和“果基鱼塘”的良好的农业生态系统。

3.华北平原及黄土高原塘库粗养渔区

本区包括秦岭—淮河以北、长城以南、黄土高原西缘以东的广大地区，属暖温带，水源不够

充分，水面积小，水库洼塘分散，管理粗放，单产较低，以塘库粗养为主。主要经济鱼类有

鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、鳊鱼、草鱼等。色泽鲜艳的黄河鲤鱼、白洋淀的河蟹以肉味鲜美而著称，

为中国人民所喜爱。

4.东北河、湖、库、泡渔业区

包括黑、吉、辽三省，本区地处高纬度，河、湖、库、泡子面积大，气候寒冷，是我国冷水

性鱼类产区之一。主要河流有黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江，还有兴凯湖、镜泊湖、松

花湖等大型湖泊。特产有镜泊湖的鲫鱼、兴凯湖的大白鱼、嫩江上游的哲罗鱼、细鳞鱼，

名贵品种有黑龙江、乌苏里江、松花江的大马哈鱼、鲑鱼、鲟鱼和鳇鱼。本区捕捞历史悠久，

但养殖历史短，基础薄弱，宜积极开发利用潜在水域，大力发展养殖业。

更多作文请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发