

葡萄球菌食物中毒如何防治

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/dd821c38d281d54cedc2748db44afcd1.html>

范文网，为你加油喝彩！

葡萄球菌引起的食物中毒主要由金葡萄产生的有关外毒素引起。 王八看绿豆

- (1)食物中毒进食含肠毒素食物后1~6小时即可出现症状，如恶心、呕吐、腹痛、腹泻，大多数病人于数小时至1日内恢复。
- (2)烫伤样皮肤综合与三角形有关的线状征多见于新生儿、幼儿和免疫功能低下的成人，开始有红斑，1~2天有皮起皱，继而形成水疱，至表皮脱落。由表皮溶解毒素引起。
- (3)毒性休克综合征由TSST1引起，主要表现为高热、低血压、红斑皮疹伴脱屑和休克等，半数以上病人有呕、腹泻、肌痛、结膜及粘膜充血，肝肾功能损害等，偶尔有心脏受累的表现。
- (4)假膜炎肠炎本质是一种菌群失调性肠炎，病理特点是肠粘膜被一层炎性假膜所覆盖，该假膜由炎性渗出物、肠粘膜坏死块和细菌组成。人群中约10~15%有少量金葡萄寄居于肠道，当优势菌如脆弱类杆菌、大肠杆菌等因抗菌药物的应用而被抑制或杀灭后，耐药的金葡萄就乘机繁殖而产生毒素，引起以腹泻为主的临床症状。

葡萄球菌食物中毒防治原则：

加强卫生宣传教育，讲究个人卫生，皮肤创伤应及时处理，注意中西医结合，合理用药，避免滥用抗生素。

用药治疗

- 1.一般治疗 轻型患者不需特殊治疗，能自愈。重者可用1~5000高锰酸钾溶液洗胃，然后用蓖麻油20ml导泻，以便除去未吸收的肠毒素及致病菌。
- 2.对症及支大学生助学金申请书持疗法 严重呕吐、腹泻者可用甲氧氯普胺10mg—15mg/次，肌内注射；亦可用氯丙嗪25mg/次，或阿托品0.5mg/次，肌内注射。同时补充水、电解质、保持水、盐电解质及酸、碱平衡。

今天
小编对葡萄球
菌食物中毒如何防治进行了
简英语3500词汇表电子版单的介绍，对于葡萄球菌感染有什么危害以及其他
食品污染小知识
还请了解更多<https://www.882682.com/>上的食品安全知识，希望对您有所帮助。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/)开发