

吴盛海

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/dfb0309b2a9b0484c7266b63f418039a.html>

范文网，为你加油喝彩！

幼儿灯笼手工制作-树叶画金鱼



2023年3月24日发(作者：公章使用管理制度)

多药联合应用离婚办理流程 抗多重耐药鲍曼不动杆菌作用探讨

金克勤;余道军

【期刊名称】《检验医学教育》

【年(卷),期】 2006(013)004

【摘要】目的:分析不同抗菌药物单用和联合应用抗多重耐药鲍曼不动杆菌作用效

果.方法:测定不同网球技术 单种抗菌药物和多种抗菌药物联合应用,对鲍曼不动杆菌的最小抑

菌浓度(MICs),然后用该浓度的不同单种抗菌药物及抗菌药物组合治疗鲍曼不动杆

菌感染的小鼠,观察各药对感染小鼠的保护作用.结果:亚胺培南/西司他丁钠、哌拉

西林/他唑巴坦、头孢哌酮/他唑巴坦、利福平、头孢他啶、丁胺卡那的英语 那、环丙沙星的

MIC分别为(g/ml):64、512、64、250、2048、2048、150;特治星(128g/ml)

使丁胺卡那(g/ml)从2048下降到64,舒普深(32g/ml)可使利福平(g/ml)从

128下降到8,舒普深(32g/ml)与丁胺卡那(1024g/ml)联合有效,泰能(32g/ml)

与丁胺卡那(1024g/ml)联合无效,特治星(256g/ml)与利福平(128g/m岑参边塞诗 I)、泰能

(16g/ml)与利福平(128g/ml)联合均无效;特治星(140.4mg/24h)、特治星(70.2

mg/24h)与丁胺卡那(7.8mg/24h)、舒普深(41.6mg/24h)与丁胺卡那(7.8

mg/24h)联合治疗,对感染小鼠的保护率(%)分别为30,100,100,舒普深(83.2

mg/24h)、泰能(83.2mg/24h)治疗组小鼠全部死亡.结论:多重耐药鲍曼不动杆菌

对正北方 常见抗菌药物的MIC均显著增加,特治星治疗多重耐药鲍草鱼的家常做法
曼不动杆菌比其他抗菌

药物效好.特治星与丁胺卡那联合、舒普深与丁胺卡那联合联合治疗有效,而泰能对

丁胺卡那、特治星等抗菌药物具有拮抗作用.合理的多药联合不仅对治疗多重耐药

鲍曼不动杆菌有效,而且可以减少药物剂量.

【总页数】5页(P40-44)

【作者】金克勤;余道军

【作者单位】温州医学院,医学检验专业2001年级,浙江,温州,325035;杭州市第一

人民医院,检验科,浙江,杭州,310006

【正文语种】中文

【中图分类】R9

【相关文献】

1.倍丙酯与抗生素联合抗多重耐药鲍曼不动杆菌作用研究[J],蔡燕;彭乙华;凌保东;

黄义山;蒋红;赖明晞;刘青松;谢文光

2.抗癆补肺汤联合化疗治疗耐多药肺结核的临床分析[J],高倩

3.多药联合应用抗多重耐药鲍曼不动杆菌的实验研究[J],余道军;董晓勤;金克勤;

周田美;陈岳明;吴盛海

4.白蛋白-生育酚纳米粒的构建及其联合化疗-光疗抗乳腺癌细胞多药耐药[J],高

乾乾;张娜娜;王昊冉;陈怡静;刘婷婷;沈海俊

5.重楼抗癆汤联合抗癆药物治疗气阴两虚耐多药肺结核临床研究白条鸡怎么做好吃
[J],朱江春;吕正

煊;刘永莉;韩祎;韩留鑫;付义

因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发