

试管婴儿减胎术要空腹吗

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/a8a39fe684301802b8eb74408a72fe89.html>

范文网，为你加油喝彩！

试管婴儿技术导致多胎率增加，三胎以上的妊娠和部分高风险的双胎妊娠，需要采用减胎术，去掉异常和多余的胚胎，以保证正常胎儿健康成长。试管婴儿减胎术要空腹吗？就让<https://www.882682.com/>的小编和你一起去了解一下吧！

多胎妊娠对孕妈的影响

1、流产：双胎的自然流产率是单胎妊娠的2~简单图片3倍。胎儿个数越多，流产率越高。

2、妊娠高血压综合征：发生率为单胎妊娠的3倍，且多为重症，不易控制，子痫发症率亦高。

3、贫血：发生率是单胎的2.4倍。贫血导致胎儿缺氧，生长迟缓。

4、羊水过多：双胎妊娠关于历史的故事羊水过多发生率12%，与双胎输血综合征及胎儿畸形有关。

5、胎盘早剥及前置胎盘：胎盘早剥是双胎妊娠产前出血的主要原因。起病急，发展快，严重威胁母儿健康。由于胎盘面积大，易扩展至子宫下段而覆盖子宫颈内口，形成前置胎盘，发生率比单胎高1倍。

春暖花开踏青的句子

6、妊娠期肝内胆汁淤积症：是单胎的2倍。易引起早产、胎儿窘迫、死胎、死产大专生。

7、产后出血及产褥感染：子宫肌纤维过度伸展导致子宫收缩乏力，胎盘附着面大，易发生产后出血和感染。

随着减胎技术的成熟，减胎成功率达到了90%以上。一般来说，妊娠周数越小，减胎成功率越

高。一頓巴速屬於哪個國家方面胚胎小容易減滅，另一方面胚胎壞死組織少，容易吸收，對其他胚胎及母體影響小。因此一般手術時機會選擇在孕8~11周左右。

減胎前有一些檢查要做：一般要查血常規、白帶常規、凝血功能、C反應蛋白等，確認沒有急 性感染，也沒有其他問題才可以安排減胎。減胎前醫生也會向家屬及本人交代術後可能的並發症 及上述風險，並簽署知情同意書。

以上就是 <https://www.882682.com/> 小編為您提供了關於
試管嬰兒減胎術要空腹嗎

的解答，希望我的解答對您有所幫助！

想要了解更多關於做試管嬰兒需具備哪些條件和備孕安全小知識及
孕嬰安全小知識請您多多關注<https://www.882682.com/>吧！

更多作文請訪問 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文網](#)開發