

早产儿什么时候查眼睛

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/4c12be12d775790edb3e230e22d21e23.html>

范文网，为你加油喝彩！

早产儿眼底筛查是非常有必要的，那么早产儿眼底筛查最佳时间在什么时候呢？早产儿什么时候查眼睛？早产儿如何度过危险期？一起和<https://www.882682.com/>看看吧。

早产儿眼底筛查的最佳时间在出生4周左右的时候。因为有的早产儿如果出现了视网膜病变，很可能会在3-4周的时候就已经比较严重了，如果晚了很可能错过治疗时机穿越恐龙。所以早发现，早治疗是唯一的办法。

早产儿怎么检查眼底

早产儿眼底筛查需要经验丰富的眼底医师在间接检眼镜下联合巩膜压迫进行检查，部分宝小梦想宝需要进一步找骆驼行小儿彩色眼底照相检查。

注意：

检查前一个小时，需要点散瞳眼水，同时检查前1小时不要喝奶，避免检查时小儿哭闹呛奶。

哪些早产儿需要进行眼底筛查

我国早产儿视网膜病变防治指南指出出生体重 $\leq 2000\text{g}$ ，或出生孕周 ≤ 32 周的早产儿都需要进行眼底筛查。注意：如果出生体重或告白日出生孕周不在筛查范围，但长时间吸氧或合并全身疾病，身体情况较差的也需要进行筛查。早产儿身体越弱，越容易患早产儿视网膜病变。

早产儿视网膜病变的原因

早产儿视网膜病变常见于早产儿，若是不及时治疗对早产儿的影响是很大的，甚至是会影响到视力。而我们熟知早产儿视网膜病变一般被划为五个阶段，不同的阶段早产儿视网膜病变的治疗效果也有些区别，那早产儿视网膜病变究竟是怎么引起的呢？早产儿为什么会经常得早产儿视网膜病变呢？

早产儿视网膜病变产生的原因就是未完全血管化的视网膜对氧产生血管收缩和血管增殖而引起

。正常视网膜血管约在胚胎36周发育达到鼻侧边缘，40周时达到颞侧缘。此期内暴露于高浓度氧，引起毛细血管内皮细胞损伤、血管闭塞，刺激纤维血管组织增生就很容易得早产儿视网膜病变。所以为了防止早产儿视网膜病变的发生，惟一有效的预防措施就是限制婴儿的用氧。
和儿子一起成长

希望以上内容对大家有帮助，想学习更多的 孕婴安全小知识
，请继续关注[https://www.882682.com/。](https://www.882682.com/)

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发