

剖腹产子宫破裂会有怎样危险

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/936648289b7bfbc61da2488e4cba7453.html>

范文网，为你加油喝彩！

剖腹产子宫破裂会有怎样危险？剖宫产的次数越多，风险越大。因为如果剖宫产后子宫壁的刀口愈合不佳，随着胎儿的发育使子宫不断增大，子宫壁变薄，尤其是手术刀口处是结缔组织，缺乏弹力，会引起破裂危险。3次或3次以上的剖宫产，子宫上的疤痕在妊娠后期有可能发生自发性子宫破裂，再临产的危险性会很大。子宫破裂会有危险吗

?一起和<https://www.8几年抗战82682.com/>看看吧。

疤痕子宫、高龄等因农博会素属于高危妊娠，就算是二次剖宫产，也需要谨慎对待。剖宫产术后留下的子宫疤痕，大连交通网车辆违章查询会给今后分娩带来很多危险。剖宫产次数越多，子宫就越脆弱，胎儿早产或“子宫破裂导致胎死宫内”的可能性就越大。对一位女性来说，一生能做几次剖宫产，没有确切数字，国外曾报道过一位产妇做过7次剖宫产。然而研究发现，72%剖宫产子宫瘢痕妊娠发生于2次以上剖宫产史者，在临幊上也多见有多次剖宫产史的产妇在生产时出现产后大出血、子宫破裂，需要抢救。

再次剖宫产间隔两年最合适

剖宫产预留充足的间隔期是降低妊娠风险的重要一环。“合适的间隔期能够让子宫的疤痕愈合牢安全生月靠，降低子宫破裂的风险。”前后两次剖腹产的时间相隔2年左右最合适。如果短期内再次怀孕，子宫破裂的危险较高，危及母子安全。而相隔时间过长，子宫疤痕已经纤维化，脆性较大，也容易被扯裂。另外，剖宫产后再怀孕有一定的风险，因此有过剖宫产史的女性准备怀孕时，最好提前到医院进行检查，请医生根据第一次剖宫产时的情况进行分析，综合判断再次妊娠的风险。

身体条件合适、剖宫产术后再次妊娠的孕妇，也是可以尝试阴道分娩的。相对来说，成功的剖宫产阴道分娩，母亲的住院时间较短、失血较少、感染较少以及2011中超排名发生血栓栓塞的事件较少。

所以在生第一胎的时候尽量选择顺产，学习更多的孕婴安全小知识，请继续关注<https://www.882682.com/>。

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发