


# 断乳

作者：有故事的人 来源：范文网 [www.wtabcd.cn/fanwen/](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1679534607354390.html>

范文网，为你加油喝彩！

大伦敦-门面房租赁合同



2023年3月23日发(作者：对孩子的祝福语简短)

泌乳旺期（产后7d—断乳）母猪的饲养

泌乳旺期（产后7d—断乳）母猪的饲养

泌乳旺期母猪饲养的目标是最大限度地增加母猪的泌乳量，

同时控制母猪的减重，保证母猪断奶后的体况适宜并顺利地进入下一

个繁殖周期。

现代母猪由于体重大、产仔数多、泌乳量高，因此需要泌乳

旺期母猪要有很高的采食量，但现代母猪的食欲往往较差，因此需要

饲喂高能高蛋白饲料且能量和蛋白质要平衡，且通过采用湿拌料、增

加饲喂次数（日喂4次）等措施增加母猪的采食量。

哺乳母猪的营养摄入量和母猪的体重、产乳量、带仔数、仔

猪生长速度及哺乳舍温度等有关，如果母猪摄入的营养不足（负营养

平衡），母猪就会动用自身体组织中的氨基酸和脂肪用于合成乳汁，

高产的泌乳母猪尤其如此，这样一方面会造成母猪体组织损失较大，

体内激素失衡，导致断奶至再发情的间隔延长，下一胎的产仔数减少，

长期的负营养平衡还会造成平均产仔数减少和繁殖利用年限缩短等

问题。

另一方面动用自身体组织中的脂肪用于合成乳汁会使乳汁

中的长链脂肪酸增加，进而导致仔猪因消化不良而腹泻。负营养平衡

的状况可通过提高采食量或提高饲粮营养水平来改善。

泌乳旺期母猪由于代谢和合成乳汁的需要，日饮水量达20 ~

30L，必须保证母猪充足的饮水聘用协议书，否则影响采食量、泌乳量。

更多 实用文体 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/93\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/93_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发