

两个月的宝宝吐奶

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/167891203910309.html>

范文网，为你加油喝彩！

鸡的组词-描写景色的文章

关于读书的名言警句大全 4 篇

关不能把小孩子的精神世界变成单纯学习学问。假如我们力求使儿童的全部精神力气都专注到功课上去，他的生活就会变得不堪忍受。他不仅应当是一个同学，而且首先应当是一个有多方面爱好、要求和愿望的人下面是我带来的有关读书的名言警句，盼望大家喜爱。

读书的名言警句 1

81、假如不想在世界上虚度一生，那就要学习一辈子。
——高尔基

82、劳动教养了身体，学习教养了心灵。——史密斯

83、做学问的功夫，是细嚼慢咽的功夫。好比吃饭一样，要嚼得烂，方好消化，才会对人体有益。——陶铸

84、学习本无底，前进莫彷徨。——报摘

85、钉子有两个好处：一个是挤劲，一个是钻劲。我们在学习上要提倡这种“钉子”精神，擅长挤和钻。——雷锋

86、好好学习，天天向上。——__

87、天赋犹如自然花木，要用学习来修剪。——培根

88、学习要抓住基本学问：即不好高骛远，而忽视基本的东西。喜马拉雅山是世界有名的高山，(.lz13.cn)由于它是建立在喜马拉雅山之上，盘基广阔高原之上的一个高峰；假如把喜马拉雅山建立在河海平原上，八千公尺的高峰

2023年3月16日发(作者：生命教育心得体会)

一个月宝宝喷射性吐奶

两个月的宝宝在吃完奶后，容易出现吐奶的情况，甚至有些吐奶

严重的宝宝会吐的像喷泉一样，今天小编就给大家介绍一个月宝宝喷射性吐奶。

宝宝吐奶，指胃里面的食物量大，且被强力排空。大多数的吐奶

现象都是大多是因为宝宝食道与胃之间的贲门还没发育成熟而导致，

有时也与爸妈的喂养不当有关。家长们可以通过以下情况来判断宝宝

吐奶原因：

正确判断宝宝吐奶OR溢奶？

判断是吐奶OR溢奶？

这两者的共同点都是有奶水吐出，但两者又是不一样的。溢奶是

指食道或胃之内的容物不由自主地被逆流到口腔外的情况，可能只是

小宝宝打了一个嗝，从而致使少量奶液从嘴角溢出而已，溢奶量较少。

而吐奶则是，宝宝喝完奶水一段时间后，胃部出现反复收缩，进而从

嘴巴喷出如小喷泉似的奶水。吐奶的量较多，可发生在喂奶后不久，

或半小时以后，吐奶前孩子有张口伸脖、痛苦难受的表情。

一般来说，轻微吐奶和溢奶，随着宝宝逐渐长大，将会有明显改

善。

判断为生理性吐奶OR病理性吐奶？

生理性吐奶通常通常发生在宝宝前4个月，特别是在新生儿阶段，是属于婴儿阶段的正常现象。一般情况是吃完后吐出来少量奶液，或者打了个嗝带出来一口奶，奶状为原状液体，一般量不多，表现为溢出或轻吐，而且吐完后没有痛苦表情，还是活蹦乱跳开开心心的。

病理性吐奶则有可能会发生在任何月龄的宝宝身上，也有可能出现在患某种疾病的宝宝身上。吐奶时呈喷射状，一般要把胃里的奶吐光，还会吐出胃液。如果是喂奶间隔很长时间了，会吐出来带奶块、有酸味的半消化奶液，而且往往身体上还有其他不适，比如说感冒、咳嗽等

宝宝吐奶，指胃里面的食物量大，且被强力排空。大多数的吐奶现象都是大多是因为宝宝食道与胃之间的贲门还没发育成熟而导致，有时也与爸妈的喂养不当有关。家长们可以通过以下情况来判断宝宝

吐奶原因：

防止吐奶的最好办法就是给孩子拍嗝。孩子在3~4个月大之后，

不仅可以很好地掌握吸吮技巧，而且贲门的收缩功能也已发育成熟，所以吐奶的次数也就会明显减少了。但是在此之前，每次喂奶后我们最好还是要帮助孩子拍嗝。

帮助孩子拍嗝的方法：将孩子竖着抱起，轻轻拍打后背5分钟以上，是帮助孩子拍嗝的基本方法。如果孩子还是不能打嗝的话，也可以试试用手掌按摩孩子的后背。还可以支起孩子的下巴，让孩子坐在自己的腿上，然后再轻拍后背。因为孩子坐着的时候，胃部入口是朝上的，因此打嗝也就比较容易了。

打不出嗝的时候，吸入胃中的空气，有时会夹在前后吸入的奶汁中，此时如果将孩子上身直立起来，有利于胃中空气的排出。因此，妈妈可以将孩子竖着抱起来，或者可以给孩子垫高后背使上身保持倾斜30分钟左右。

如果孩子吐奶了，让他上身保持抬高的姿势，一旦呕吐物进入气管会导致窒息。因此在让孩子躺下时，最好将浴巾垫在孩子身体下面并要保持上身抬高。如果孩子躺着时发生吐奶，我们可以把孩子脸侧向一边。吐奶后，要多注意观察孩子的状况，在孩子躺着时要把孩子

头部垫高，或者索性把孩子竖着抱起来。吐奶后，孩子的脸色可能会不好，但只要稍后能恢复过来就没有问题。另外，根据情况可以适当给孩子补充些水分。

补充水分要在孩子吐奶后30分钟进行，用勺一点点地试着给孩子喂些白水，如果马上给孩子补充水分，可能会引起再次吐奶。吐奶后，在宝宝精神恢复过来又想吃奶的时候，我们可以再给宝宝喂些奶。但喂奶量要减少到平时的一半左右，不过喂奶次数可以增加。在宝宝持续呕吐期间，只能给宝宝喂奶，而不能喂其他食物，包括辅食。喂奶最好做到少而勤，并且每次喂奶后最好能帮助孩子拍嗝。如果每次吃奶后孩子都要吐奶的话，就需要我们对每次喂奶的数量以及间隔进行适当的调整了。

1个月的宝宝吐奶像喷泉一样该怎么办?一般建议在给宝宝喂完奶后拍嗝，能预防宝宝吐奶。另外，还应该注意喂奶的姿势和喂奶量，也可以起到预防吐奶的作用。当宝宝出现吐奶的情况时，要抬高宝宝的体，并帮助宝宝拍嗝，半个小时后再给宝宝适当的补充水分即可。

更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发