

## 儿科护理学 复习题2套

作者：有故事的人 来源：范文网 [www.wtabcd.cn/fanwen/](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/169980991330588.html>

范文网，为你加油喝彩！

操行评语-白云山南门



2023年11月13日发(作者：带数字的成语有哪些)

### 《儿科护理学》复习题1

#### 一、单项选择题

1、儿童的解剖结构、生理功能和心理行为等在不同阶段表现出与年龄相关的规律，所以一般将儿童年龄分为7个时期。其中新生儿期是（ ）。

A、 出生～生后满28天 B 、 出生～生后满30天

C、 出生～生后满2个月 D 、 出生～生后满15天

2、前囟是由额骨和顶骨形成的菱形间隙，在出生时为（ ）。

A、 1.5～3cm B、 1～5cm C、 2～2.5cm D、 1.5～2cm

3、下列（ ）不是小儿生长发育的规律。

A、 生长发育是连续的过程 B 、 有个体差异

C、 小儿动作发育是从下到上 D 、 小儿生殖系统发育相对较晚

4、（ ）是最能反映小儿营养状况的体格发育指标。

A、 身长 B 、 体重 C 、 头围 D 、 胸围

5、新生儿根据出生体重分类，可以分为正常出生体重儿、巨大儿和低出生体重儿，其中巨大儿是指( )。

A、 出生体重不足1.5kg B、 出生体重不足2.5kg

C、 出生体重大于4kg D、 出生体重大于3kg

6、下列（ ）不是新生儿特殊生理状态。

A、 生理性黄疸 B 、 生理性体重下降

C、 假月经 D 、 病理性黄疸

7、引入食物的量和质应遵循循序渐进的原则，（ ）不是事物转换的原则。

A、 由少到多 B 、 由稠到稀

C、 由细到粗 D 、 由一种到多种

8、为了预防佝偻病，新生儿出生第2周开始补充维生素D（ ）。

A、 400IU/d B 、 600IU/d C 、 800IU/d D 、 4000IU/d

9、维生素D缺乏性佝偻病初期，多见于婴儿（特别是6个月内）会出现（ ）。

A、 夜惊多汗 B 、 前囟闭合过早 C 、 X 形腿 D 、 智力发育落后

10、新生儿少尿指( )。

A、 每小时