

# 胎位检查及注意事项

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/170046780533076.html>

范文网，为你加油喝彩！

青春节拍-皮蛋的营养价值



2023年11月20日发(作者：暴风雨前的宁静)

胎位检查及注意事项

胎位检查有必要做吗

胎位是指胎儿在母体内的姿势，胎儿在母体子宫里的正确姿势应该是头朝下，屁股朝上。

胎儿出生前在母体子宫里的姿势很要紧，它关系到孕妇是顺产还是难产，顺产的胎儿头部应该先进入阴道，有很多的胎儿头部先进入到阴道，但是头部是仰着的，也属于胎位不正，胎位不正对于胎儿和母体的危害很大。

而胎位检查有必要做吗？答案是肯定的。胎位检查的作用：通过孕晚期的一系列检查，基本能确定胎位的正常与否。如果发现准妈妈胎位不正，就可进行胎位的矫正；胎位也是分

娩方式选择的依据之一。

由于胎位不正会给分娩带来不同程度的困难和危险，故早期纠正胎位，对难产的预防有着重要的意义。

怀孕7个月前，由于羊水相对较多，胎儿较小，在子宫内活动范围较大，所以位置不容易固定。在孕7个月前发现的胎位不正，此时在医生的指导下能调整过来的可能性较大。反之，如果过晚检查，在孕34周后才发现胎位不正，此时胎位可调整过来的可能性不大，因此准妈妈需要做好选择剖腹产的心理准备。

### 胎位检查是什么

胎位检查是产前检查的主要项目之一，一般在妊娠七个月左右检查。由于胎位异常将给分娩带来程度不同的困难和危险，故早期纠正胎位，对难产的预防有着重要的意义。那么，胎位检查是什么呢？

胎位检查，就是检查胎儿在母体子宫内的位置，一般在怀孕7个月以后可通过B超和触诊等方式检查。胎位不正一般是指妊娠30周后，胎儿在子宫体内的位置不正，较常见于腹壁松弛的准妈妈和经产妇。胎位不正包括臀位、横位、枕后位、颜面位等。其中，臀位比较常见，横位对准妈妈和胎儿的影响是最严重的。

胎儿出生前在子宫里的姿势非常重要，医学上也把胎位做为分娩方式的选择依据之一。

比较合适的胎位调整时间为孕30—32周。

胎位是指胎儿先露的指定部位与母体骨盆前、后、左、右的关系，正常胎位多为枕前位。

妊娠30周后经产前检查，发现臀位、横位、枕后位、颜面位等谓之胎位不正，其中以臀位为常见。胎位不正如果不纠正，分娩时可造成难产。

### 胎位loa是什么意思

胎位的学问其实是比较大的，胎位本身的种类其实也有比较多的。所以，不少的孕妇对于胎位的了解也是比较重要的，因为不少孕妇对此知识比较少，胎位loa的知识有不少的很

多孕妇根本就不了解。下面就一起去看看究竟胎位loa是代表的什么意思吧。

胎位loa指的就是一些身体上的胎位缩写方式，胎位首先是属于一些先露部，代表的是在产妇的骨盆所在的一些位置，当然也是指的骨盆的四相位，就是右前、左后、左前、右后这些地方。

预产期不是精确的分娩日期，科学家们统计过只有53%左右的妇女在预产期那一天分娩。

预产期可以提醒胎儿安全出生的时间范围，但不要把预产期这一天看得那么精确。真正分娩在预产期的39周左右都属正常。如果胎儿正常最好顺产，不论是剖腹还是自然分娩最好都是要等到疼了后在决定，最好是顺产，对宝宝和妈妈都好。

子宫出现不规则收缩，孕妇会感到肚子隔一定时间就紧一次，越来越勤，这是开始临产的一个重要现象。子宫开始有规则收缩前后，会流出一些混有血的粘液，这就是见红，医学上叫做产兆。见红是由于子宫颈宫逐渐扩张大，子宫颈里的粘液和子宫颈宫壁少量出血混会在一起形成的；血量不多，是开始临产的可靠现象；如果血量多，超过了月经量时，就要注意是否有产前出血，要及时做进一步检查。绝大多数产妇是在子宫口开全前后破水，少数产妇可在开始临产前破水，所以，怀孕到月，若是流出羊水时，表示已经破膜，要开始临产了。...

胎位roa是什么意思

胎位的检查基本上从孕28周后即开始做检查，频率为每2周一次；在32周之后，胎位基本上已经确定了。有些孕妈妈在做B超检查的时候，每次医生都写胎位roa，那胎位roa是什么意思？

胎位是指胎儿先露的指定部位与母体骨盆前、后、左、右的关系，正常胎位多为枕前位。

妊娠30周后经产前检查，发现臀位、横位、枕后位、颜面位等谓之胎位不正，其中以臀位为常见。胎位不正如果不纠正，分娩时可造成难产。

而胎位roa是胎儿在子宫内的位置是右枕前的意思，属于正常胎位，孕妈妈无须紧张。B超roa为顶尖露，枕骨在骨盆右侧，朝前，胎位为右枕前位，在顺产的最佳胎位来讲，这种

胎位排第二。

胎位的写法由三方面来表明：

- 1、代表骨在骨盆的左侧或右侧，简写为左（L）或右（R）；
- 2、代表骨名称，如顶先露为“枕”，即“O”，臀先露为“骶”，即“S”，面先露为“颏”，即“M”，  
肩先露为“肩”，即“Sc”；
- 3、代表骨在骨盆之前、后或横，例如顶先露，枕骨在骨盆左侧，朝前，则胎位为左枕前（LOA），为最常见之胎位。

顶先露有六种胎位：

左枕前（loa）；左枕横（lot）；左枕后（lop）；右枕前（roa）；右枕横（rot）；右枕后（rop）这些都属于正常胎位。

产前定期检查很重要，如果孕妈妈发现宝宝胎位不正，应及时加以纠正，减少难产的风险。 ...

胎位检查要注意什么

通常，医学上称枕前位为正常胎位，这种胎位分娩一般比较顺利。而在产前做的胎位检查主要是检测胎位是否不正，如果胎位不正的话，可能就需要做出相应措施，那么胎位不正需要注意什么？

- 1、横位应做选择性剖腹产，臀位分娩，初产妇多作剖腹产；经产妇，胎儿较小、骨盆够大者，可考虑阴道分娩。
- 2、膝胸卧位操纠正，孕妇排空膀胱，松解腰带，在硬板床上，俯撑，膝着床，臀部高举，大腿和床垂直，胸部要尽量接近床面。每天早晚各1次，每次做15分钟，连续做1周，然后去医院复查。
- 3、医生为孕妇施行转向，如果在孕32周-34周时，胎儿仍未转向，医生就要考虑为孕妇实行外转胎位术，让胎儿翻转，使孕妇能顺利分娩，外转胎位术有一定的风险性。操作时，

会导致脐带缠绕或胎盘早剥。

4、针对胎位不正，我国有针灸治疗的成功先例。用针刺至阴穴，治疗胎位不正，每日1次，每次15~20分钟，5次为一疗程，适用于妇科检查诊断为臀位、横位、斜位的孕妇。

5、作好产前检查，预先诊断出胎位不正，及时治疗，如未转为头位，则需要在预产期前1~2周住院待产，由医生根据孕妈妈的具体情况决定分娩方式。

## 田字开头的成语-梨汤的功效



更多在线阅览 请访问 [https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发