

# 妇产科护理学

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/170047005033092.html>

范文网，为你加油喝彩！

站在烦恼里仰望幸福-一览众山小的小



2023年11月20日发(作者：年会音乐)

## 妇产科护理学-3-3

(总分50,考试时间90分钟)

1. 胎儿急性缺氧，早期胎动特点是A . 躁动

B . 减弱

C . 消失

D . 不变

E . 减少

2. 手术产新生儿护理中，错误的护理措施是A . 严密观察呼吸、面色、哭声

B . 头皮有破损，局部涂1%龙胆紫

C . 头皮血肿早期可热敷

D . 常规每日肌内注射维生素K1

E . 保证营养和水分摄入

3. 为改善胎儿窘迫的缺氧状态，错误的护理措施是A. 嘱孕产妇取左侧卧位

B. 给予孕产妇氧气吸入

C. 继续静脉滴注缩宫素

D. 严密监测胎心音变化

E. 给予碱性药纠正酸中毒

4. 早产儿护理中，下列哪项是错误的A. 分娩时产房温度维持在27~28

B. 新生儿室温度保持24~26

C. 体重在2000g以下早产儿应放入暖箱

D. 禁止家属探视

E. 防止窒息，应快速给予高浓度氧气吸入

5. 新生儿青紫窒息的临床表现；错误的是A. 皮肤苍白，口唇青紫

B. 呼吸浅或不规则

C. 心率80~120次/min

D. 肌张力好

## E. 对外界刺激有反应

6. 张女士，28岁，第一胎，孕足月，今晨产钳助娩一男婴，体重3.5kg，出生后Apgar评分

7分，该新生儿护理措施中，不妥的是A. 严密观察面色、呼吸、哭声

B. 补充营养、必要时静脉补液

C. 保持清洁，每天淋浴

D. 常规使用维生素K1肌注

E. 3d后情况正常可以抱奶

7. 下述哪项不是急性胎儿窘迫的临床表现A. 胎心140次/min

B. 胎心100次/min

C. 胎动频繁

D. 胎动减弱

E. 胎心低弱而不规律

8. 异位妊娠，常发生的部位是A. 卵巢

B. 宫颈

- C . 腹腔
- D . 输卵管
- E . 子宫直肠陷凹

9. 异位妊娠病人就诊的主要症状是

- A . 停经
- B . 腹痛
- C . 阴道流血
- D . 恶心、呕吐
- E . 头晕

10. 下列哪项不属于高危妊娠的范畴

- A . 年龄35岁以上
- B . 妊高征患者
- C . 枕右前位
- D . 双胎
- E . 曾有自然流产史

11. 高危妊娠指A . 对胎儿有高度危险的妊娠

B . 对母亲有高度危险的妊娠

C . 对新生儿有高度危险的妊娠

D . 凡能危害母儿或导致难产的妊娠

E . 凡可能导致难产的妊娠

12. 过期妊娠指妊娠达到或超过A . 40周

B . 41周

C . 42周

D . 43周

E . 44周

13. 前置胎盘患者进行产科检查，错误的是A . 胎方位清楚

B . 先露高浮

C . 胎心正常

D . 子宫大小与停经月份一致

E . 宫颈抬举痛明显

14. 预防子痫发作，错误的护理措施是A . 嘱病人绝对卧床休息

B . 保持病房光线充足

C . 保持环境安静

D . 各项治疗操作集中进行

E . 监测生命体征及神志变化

15. 某孕妇，孕38周，突然感到剧烈腹痛伴有少量阴道流血。检查：血压20/14.6kPa。

(150/110mmHg)，子宫似足月妊娠大小，硬如木板、有压痛。胎心90次/min，胎位不清，最

大可能是A . 早产

B . 临产

C . 前置胎盘

D . 胎盘早期剥离

E . 不完全性子宫破裂

16. 孕妇由于妊高征应用硫酸镁治疗，在治疗过程中出现膝反射消失，呼吸浅而慢，10次

/min，此患者除立即停药外，应给下述哪种药物A . 5%葡萄糖静脉滴注

B . 肌注山莨菪碱

- C . 静注50%葡萄糖
- D . 静注10%葡萄糖酸钙
- E . 静注低分子右旋糖酐

17. 某孕妇，孕1产0，孕37周，诊断“中度妊娠高血压综合征”住院治疗。自诉因担心药物影响胎儿发育成长，不愿接受药物治疗，但又怕不服药会使病情加重，威胁胎儿的安全，心情矛盾。在护理措施中，首先考虑

- A . 测量血压2~4次/d

- B . 安静地休息
- C . 观察症状
- D . 心理护理
- E . 观察并发症

18. 李女士娩一女婴，身长35cm，体重1000g，皮下脂肪少，头发、指甲已长出。新生儿娩出后能啼哭、吞咽，但生活能力很差。估计该新生儿娩出时孕周为

- A . 8周

- B . 16周
- C . 20周
- D . 28周
- E . 40周

19. 育龄妇女，停经58d后，阴道流血3 d，血量增多1d，伴腹痛下坠，妇检：子宫增大如孕50 d大小，软，宫口开一指，尿妊娠试验阳性，应首先考虑A . 先兆流产

B . 难免流产

C . 不完全流产

D . 过期流产

E . 葡萄胎

20. 某妇女，30岁，停经50d，阴道流血1 d，血量多于月经，鲜红色，伴有下腹部坠痛。

内诊：子宫增大如孕50天大小。宫颈内口可容1指，阴道有活动性出血，妊娠试验(+)，此

妇女诊断可能是A . 宫外孕

B . 先兆流产

C . 过期流产

D . 感染性流产

E . 难免流产

21. 妊娠满28周不满37周终止者，称为A . 流产

- B . 早产
- C . 足月产
- D . 过期产
- E . 难产

22. 羊水过多是指妊娠期羊水量超过A . 1 000 ml

- B . 2 000 ml
- C . 3 000 ml
- D . 4 000 ml
- E . 5 000 ml

23. 可确诊输卵管妊娠流产或破裂的辅助检查是A . 妊娠试验

- B . 腹部检查
- C . 血常规检查
- D . X线检查
- E . 后穹隆穿刺

24. 单女士，妊娠38周，因出现恶心、呕吐、食欲不振来院检查，诊断为急性病毒性肝炎

入院待产。错误的处理是A. 立即终止妊娠

B. 缩短第二产程

C. 胎儿娩出后注射宫缩剂

D. 新生儿隔离4周

E. 新生儿注射乙肝疫苗

25. 某孕妇，34岁，初次怀孕，孕16周出现心慌、气短，检查发现心功能属于Ⅱ级。经过

增加产前检查次数，严密监测孕期等处理，目前孕37周，自然临产。该产妇的体位最好是

A. 平卧位

B. 右侧卧位

C. 左侧卧位

D. 半卧位

E. 随意卧位

26. 关于妊娠合并心脏病叙述，下列哪项不对A. 妊娠合并心脏病是孕产妇死亡的主要原因之一

之

B. 妊娠32~34周血容量增加达高峰

C . 分娩第二期比第一期心脏负担重

D . 分娩第三期心脏负担仍很重

E . 产后2~3d心脏负担减轻

27. 关于妊娠合并肝炎，下述哪项不对A . 使早孕反应加重

B . 孕晚期易发生妊高征

C . 分娩期易发生产后出血

D . 对胎儿无影响

E . 妊娠期易发生病毒性肝炎

28. 妊娠合并急性病毒性肝炎的护理措施，下述哪项不妥A . 严格隔离，杜绝交叉感染

B . 出入病房应用消毒水洗手

C . 病人呕吐物、排泄物均应严格消毒处理

D . 病人的新生儿不必与病人隔离

E . 新生儿应注射乙肝疫苗

29. 对妊娠合并心脏病患者，下列哪项护理是错误的A . 每日至少睡眠10h

- B . 给予低盐易消化无刺激饮食
- C . 秘者给予灌肠
- D . 心功能三级以上者,记出入液量
- E . 防止受凉

30. 急产是指总产程在A . 7 h内

- B . 3 h内
- C . 4 h内
- D . 5 h内
- E . 6 h内

31. 下述哪项不支持胎膜早破诊断A . 阴道持续性流液

- B . 宫缩时肛查触不到前羊膜囊
- C . 羊水涂片镜检可见羊齿状结晶
- D . 阴道排液酸碱试纸检查呈弱酸性
- E . 羊水涂片染色可见毳毛

32. 胎膜早破的护理，下列哪项是错误的A . 立即听胎心并记录破膜时间

B . 破膜超过12h尚未临产遵医嘱给予抗生素

C . 卧床休息，抬高臀部

D . 若头先露不须观察脐带脱垂情况

E . 注意羊水的性状和颜色

33. 出现先兆子宫破裂时，应立即肌内注射A . 哌替啶

B . 钙剂

C . 硫酸镁

D . 地塞米松

E . 缩宫素

34. 产后出血应急护理中，哪项不妥A . 应迅速而又有条不紊地抢救

B . 医生到后，方可采取止血措施

C . 宫缩乏力引起的出血立即按摩子宫

D . 压出官腔积血可促进宫缩

E . 注射子宫收缩剂

35. 胎膜早破是指A . 胎膜在第二产程破裂

B . 胎膜在临产前破裂

B . 产后宫缩乏力

C . 凝血功能障碍

D . 软产道裂伤

E . 胎儿窘迫

37. 胎儿娩出后胎盘多长时间尚未娩出者，称为胎盘滞留A . 15 min

B . 20 min

C . 30 min

D . 1 min

E . 2 min

38. 不属于先兆子宫破裂的临床表现为A . 子宫收缩力强

B . 子宫病理性缩复环

C . 子宫下段压痛

D . 胎心率100次/min

E . 腹壁下清楚触及胎儿肢体

39. 某患者，因“胎膜早破”入院。检查：头先露，未入盆，其余正常，错误的护理措施是A . 绝

对卧床休息，禁灌肠

B . 休息时取半卧位

C . 严密观察胎心音

D . 严密观察流出羊水的性状

E . 指导孕妇自测胎动

40. 某患者，第一胎，足月顺产，当胎儿娩出后，即阴道出血约为500ml，血液呈鲜红色，

很快凝成血块，此时胎盘尚未娩出，根据上述情况，考虑出血原因可能是A . 宫缩乏力

B . 软产道损伤

C . 胎盘滞留

D . 胎盘残留

E . 凝血功能障碍

41. 关于产褥感染的护理，下述哪项不妥A . 产妇取平卧位

B . 进行床边隔离

C . 高热病人，可物理降温

D . 产妇出院后严格消毒所用卧具和用具

E . 产妇体温达38℃时，应暂停哺乳

42. 关于产褥感染的防治，下述哪项不妥A . 加强孕期保健

B . 产时尽量少做肛查

C . 产前、产时常规应用抗生素

D . 产褥期保持外阴清洁

E . 掌握阴道检查适应证

43. 产褥感染最常见的病变是A . 急性输卵管炎

B . 急性子宫内膜炎

C . 急性盆腔结缔组织炎

D . 盆腔腹膜炎

E . 血栓性下肢静脉炎

44. 产褥感染体温过高的护理措施中，错误的是A. 嘴病人卧床休息

B. 体温超过39 不予物理降温

C. 鼓励病人多饮水

D. 病房要定时通风

E. 给予易消化的半流质饮食

45. 产褥感染护理措施中，哪项不妥A. 防止交叉感染，进行床边隔离

B. 产妇平卧臀部抬高

C. 体温超过38 应停止哺乳

D. 保证营养摄入

E. 保持外阴清洁

46. 某产妇，产后6d发热40°，恶露多而混浊，有臭味，子宫复旧不佳，有压痛。下述哪

项护理不妥A. 半卧位

B. 床边隔离

C. 物理降温

D. 抗炎治疗

E . 坐浴1~2次/d

47. 妇科检查注意事项，哪项不妥A . 做好心理护理

- B . 检查前排尿
- C . 台垫应每人更换
- D . 阴道出血照常检查
- E . 未婚者用肛腹诊

48. 妇科检查床的台垫更换应A . 每人

- B . 每天
- C . 隔天
- D . 每周
- E . 必要时

49. 目前普查宫颈癌的主要方法是A . 活组织检查


- B . 阴道脱落细胞检查

- C . 子宫内膜检查
- D . 子宫颈刮片检查
- E . 阴道镜检查

50. 有关妇科检查准备和注意事项，下述哪项不妥
- A . 检查时应认真、仔细
  - B . 防止交叉感染

**管理能力评价-自强不息厚德载物**

爱，  
是教育的全部，  
就沒有教育。



更多 在线阅览 请访问 [https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发