

血府逐瘀胶囊的功效与作用

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/16781679475544.html>

范文网，为你加油喝彩！

"幼儿英语"-腰怎么练



2023年3月7日发(作者：经营成果)

血府逐瘀胶囊治疗急性附睾炎的疗效观察

黄慧;潘晖;钟光俊;成少平;刘昌茂;周章炎

【摘要】目的：探讨血府逐瘀胶囊联合抗菌药物及地塞米松治疗急性附睾炎的临

床疗效。方法：选取2014年6月—2016年1月荆州市第一人民医院收治的急性

附睾炎患者120例，以随机数字表法分为观察组和对照组各60例。对照组患者给予抗菌药物和地塞米松治疗，观察组患者在对照组的基础上联合血府逐瘀胶囊治疗，比较2组的临床疗效。结果：观察组的总有效率为93.3%（56 / 60），对照组为73.3%（44 / 60）；观察组患者的附睾结节遗留率为3.3%（2 / 60），对照组为16.7%（10 / 60），2组的差异均有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。结论：在有效抗感染治疗的基础上，早期应用地塞米松联合血府逐瘀胶囊治疗急性附睾炎，可显著提高疗效，降低附睾结节遗留率。

%OBJECTIVE:To probe into the clinical efficacy of Xuefuzhuyucapsules combined with antibiotics and S:120 patients with acute epididymitis admitted into Jingzhou the First People's Hospital from Jun.2014 to Jan.2016 were selected to be divided into observation group and control group via the random number table, with 60 cases in trol group were retreated with antibiotics and dexamethasone, while the observation group additionally received Xuefuzhuyucapsules nical efficacy were compared between S: The total effective rate of observation group was

93.3%(56/60),andcontrolgroupwas73.3%(44/60).Theepididymal

callosityratesofobservationgroupandcontrolgroupwererespectively

3.3%(2/60)and16.7%(10/60),withstatisticallysignificant

difference($P < 0.05$), 评定为附睾结节遗留阳性。

1.4统计学方法

采用SPSS19.0统计学软件对数据进行处理，计数资料采用 χ^2 检验， P